

Informe Epidemiológico

DENGUE- 24/11/11

Até o momento foram notificados **60.357** casos de dengue em Minas Gerais.

- Existem **06** óbitos em investigação e **20** óbitos confirmados ambos para dengue grave*.
- Os óbitos confirmados por Dengue Grave ocorreram nos seguintes municípios: *01 óbito por FHD confirmado em Recreio, 01 em Juiz de Fora, 01 em Contagem, 01 em Água Boa, 01 em Itabirinha de Mantena e 01 em Timóteo. Há também 01 óbito por DCC confirmado em Coroaci, 01 em Januária, 01 em Nova Serrana, 01 em Itabira, 01 em Mantena, 01 em Rio Acima, 01 em Visconde do Rio Branco, 01 em Ipatinga, 02 em Uberaba, 02 em Timóteo, 01 em Contagem e 01 em Mutum.*

***DENGUE GRAVE= CASOS DE FHD e DCC**

Comparando-se o número de casos de 2011 ao mesmo período do ano de 2010 (janeiro a outubro) percebe-se queda significativa em todos os meses

Mês de Início de Sintomas	Ano	
	2010	2011
Janeiro	19.072	7937
Fevereiro	35.351	9219
Marco	66.816	12276
Abril	72.628	12624
Maiο	45.046	9562
Junho	9.023	2735
Julho	2.973	1462
Agosto	1.823	1168
Setembro	1.727	1.191
Outubro	1.452	1.536
Novembro	2.263	647
Dezembro	3.741	0
TOTAL	261.915	60.357

Municípios de residência com maior número de casos notificados de dengue, MG, 2011

Nos 20 municípios com maior número de casos notificados no Estado, temos o equivalente a 56% do total de casos.

Município	Casos notificados
Belo Horizonte	7741
Juiz de Fora	2934
Governador Valadares	2709
Uberaba	2546
Ipatinga	1946
Contagem	1915
Betim	1856
Curvelo	1480
Coronel Fabriciano	1185
Ituiutaba	1127
Rio Novo	1080
Uberlândia	1057
Patos de Minas	1013
Timóteo	920
Montes Claros	855
Leopoldina	788
Recreio	733
Cataguases	686
Mutum	665
Santa Luzia	604
Total	33.840

- A FUNED comprovou a transmissão simultânea por diferentes sorotipos no Estado, através dos exames de isolamento viral: DEN-1, DEN-2 e DEN-3 a partir de 2008, fato que propicia o aumento da transmissão de dengue e a ocorrência de maior número de casos na forma grave.
- Foi detectada a introdução do sorotipo DEN-4 no Brasil no mês de julho de 2010, e em Minas Gerais a presença deste sorotipo foi confirmada em setembro de 2011.

- A SES-MG reitera a importância das ações de controle e prevenção por parte do poder público e da população. Todas devem ser mantidas e intensificadas, uma vez que em Minas já circulam os demais sorotipos (DEN 1, 2 e 3).